

Angelonia Archangel

Angelonia angustifolia Benth.

Ball

A Angelônia Archangel apresenta uma serie de 4 cores vibrantes com flores únicas que prosperam em alta temperatura e umidade, formando maciços diferenciados em cor e formas exclusivas. Desenvolvida para o calor do verão, possuindo hábito de crescimento uniforme, excelente perfilhamento e resistência. Pode ser cultivada no pote 11 ao 20, com possibilidade posterior de transplântio em canteiros, aceitando podas.



Archangel Dark Purple



Archangel Dark Rose



Archangel Ruby Sangria



Archangel White Improved



**Archangel
Dark Purple**



**Archangel
Dark Rose**



**Archangel
Ruby Sangria**



**Archangel
White Improved**

A propagação de cultivar protegida sem autorização é infração prevista na Lei de Proteção de Cultivares (Lei nº 9.456/97) sujeitando o infrator as penalidades legais.

Angelonia Archangel

Guia básico de cultivo.

Angelonia angustifolia Benth.

Ball

Estação:

- Transplante da semana 1 a 52 (ano todo).

Recebimento dos plugs:

- Transplante imediato após o recebimento dos plugs.
- Evitar exposição à luz solar direta.
- Evitar temperaturas extremas (máximas e mínimas).

Tamanho de pote e pinch:

- Ø14 cm - 1 planta por vaso - 2 pinch.
- Pode ser transplantada posteriormente para o solo.
- Aceita poda sem problemas, estimulando novo perfilhamento.

Substrato:

- Utilizar um substrato leve e com boa drenagem.
- PH ideal: 5,5 a 6,2.

Temperatura:

- **Temperatura ideal** entre 15°C e 30°C.
- Apresenta excelente desempenho sob condições de calor intenso e alta umidade.
- Deve-se evitar exposição a geadas ou frio intenso.

Infraestrutura:

- Plástico difusor ou transparente.
- Sombreamento com sombrite ou tela aluminizada em situações de temperaturas extremas.

Ciclo de produção:

- Ø 14 cm – 7 a 9 semanas.

Adubação:

- **EC** 1,4 a 2,0 mS/cm.
- **NPK** 15-10-15, complementado com cálcio, magnésio e micronutrientes.

Condução de crescimento:

- Hábito ereto, uniforme, com excelente perfilhamento.
- Pinch favorece a ramificação e consequentemente a floração.
- Alta luminosidade melhora significativamente a qualidade da planta, estimulando a ramificação, a floração precoce e o desenvolvimento do porte ideal.

Pragas:

- Ácaro-rajado (*Tetranychus urticae*)
- Mosca-branca (*Bemisia tabaci*).
- Pulgões (*Aphis* sp., *Myzus* sp. e *Brevicoryne* sp.).
- Trips (*Thrips* sp. e *Frankliniella* sp.)

Doenças:

- Oídio (*Erysiphe* sp., *Sphaerotheca* sp. e *Oidium* sp.).
- Mofo cinzento (*Botrytis* sp.)
- Podridão das raízes (*Pythium* sp.)
- Podridão radicular (*Rhizoctonia* sp.).

NOTA: As informações deste folheto têm caráter exclusivamente orientativo. As práticas de manejo podem apresentar resultados diferentes conforme as condições de cultivo, clima, região e época do ano. A Ball Horticultural do Brasil não se responsabiliza pelos resultados obtidos a partir do uso destas informações, tendo em vista as circunstâncias diversas envolvendo o cultivo. Este material não substitui a consulta a um profissional qualificado, tampouco a necessidade de uma avaliação e diagnóstico técnico para a sua aplicação adequada.