



# Dianthus Capitan

*Dianthus caryophyllus* L.



# Ball

A linha Dianthus Capitan foi desenvolvida como uma premissa de ser uma linha premium de maior porte de planta em relação dos que existem no mercado. Sortimento composto por 6 diferentes tons de cores mescladas em suas flores e que trazem uma amavel fragância ao ambiente em que é exposto. Recomendado para plantio em pote 14 ou maiores, o produto contrasta com sua exuberância estética e potencial de resistência a climas mais quentes.



Dianthus Capitan Cook




Dianthus Capitan Colón



Dianthus Capitan Sir Henry



Capitan Calizo



Capitan Colón



Capitan Cook



Capitan Sir Henry

A propagação de cultivar protegida sem autorização é infração prevista na Lei de Proteção de Cultivares (Lei nº 9.456/97) sujeitando o infrator as penalidades legais.

# Dianthus Capitan

## Guia básico de cultivo.

*Dianthus caryophyllus* L.

# Ball

### Estação:

- Transplante da semana 1 a 53 (ano todo).

### Recebimento dos plugs:

- Transplante imediato após o recebimento dos plugs.
- Evitar exposição à luz solar direta.
- Evitar temperaturas extremas (máximas e mínimas).

### Tamanho de pote e pinch:

- Ø15 cm - 1 planta por vaso - 1 pinch.
- Pode ser transplantada posteriormente no jardim.
- Aceita poda estimulando novo perfilhamento.

### Substrato:

- Utilizar um substrato leve e com boa drenagem.
- PH ideal: 5,8 a 6,2.

### Temperatura:

- **Temperatura ideal** entre 15 °C e 30 °C.
- Serie mais resistente ao calor do mercado permitindo florescimento o ano todo.

### Infraestrutura:

- **Plástico** difusor ou transparente.
- **Sombreamento** com sombrite ou tela aluminizada em situações de temperaturas extremas.

### Ciclo de produção:

- Ø 14 cm – 12 a 13 semanas.

### Adubação:

- **EC** 1,5 a 2,0 mS/cm.
- **Adubação inicial** com NPK 15-10-15, complementado com cálcio, magnésio e micronutrientes.
- A partir da 4ª semana substituir por formulação com maior teor de potássio, como NPK 16-5-25 ou 10-10-30.

### Rega:

- Manter boa umidade no início.
- Utilizar irrigação localizada (gotejo).
- Preferir regas pela manhã para reduzir doenças.

### Pragas:

- Mosca-branca (*Bemisia tabaci*).
- Mosca-minadora (*Liriomyza huidobrensis*).
- Pulgões (*Aphis* sp., *Myzus* sp. e *Brevicoryne* sp.).
- Tripes (*Thrips* sp. e *Frankliniella* sp.).

### Doenças:

- Fusariose (*Fusarium* sp.).
- Mofo cinzento (*Botrytis* sp.).
- Oídio (*Erysiphe* sp., *Sphaerotheca* sp. e *Oidium* sp.).
- Podridão radicular (*Rhizoctonia* sp.).

### Regulador de crescimento:

- O uso de regulador de crescimento pode ser necessário durante o ciclo de produção, dependendo do porte desejado da planta e das condições de cultivo

**NOTA:** As informações deste folheto têm caráter exclusivamente orientativo. As práticas de manejo podem apresentar resultados diferentes conforme as condições de cultivo, clima, região e época do ano. A Ball Horticultural do Brasil não se responsabiliza pelos resultados obtidos a partir do uso destas informações, tendo em vista as circunstâncias diversas envolvendo o cultivo. Este material não substitui a consulta a um profissional qualificado, tampouco a necessidade de uma avaliação e diagnóstico técnico para a sua aplicação adequada.