

Calibrachoa

Cabaret

Ball

Calibrachoa X hybrida hort. ex Voss


A série Calibrachoa Cabaret apresenta cores sólidas e vibrantes, além de uma excepcional uniformidade entre as variedades. Possui tolerância ao calor e as altas temperaturas do verão. Excelente ramificação o que proporciona vasos e cuias bem formadas e cheias. Direcionada para uso em varandas ou espaços iluminados e abrigados, não sendo indicado para canteiros ou áreas desprotegidas. Pode ser cultivada do pote 11 ao 20 e com excepcional performance em cuias pendentes.




Cabaret Deep Yellow




Cabaret Good Night Kiss



Cabaret
Light Pink Kiss



Cabaret
Midnight Blue



Cabaret
Orange



Cabaret
Red



Cabaret
Bright White Improved



Cabaret
Deep Yellow



Cabaret
Good Night Kiss

A propagação de cultivar protegida sem autorização é infração prevista na Lei de Proteção de Cultivares (Lei nº 9.456/97) sujeitando o infrator as penalidades legais.

Calibrachoa Cabaret

Ball

Guia básico de cultivo.

Calibrachoa X hybrida hort. ex Voss

Estação:

- Transplante da semana 1 a 52 (ano todo).

Recebimento dos plugs:

- Transplante imediato após o recebimento dos plugs.
- Evitar exposição à luz solar direta.
- Evitar temperaturas extremas (máximas e mínimas).

Tamanho de pote e pinch:

- Ø14 cm - 1 plantas por vaso - 1 pinch.
- Ø21 a 26 cm - 3 plantas por vaso - 1 pinch.
- Plantas podem ser conduzidas sem pinch fazendo a remoção das primeiras flores promovendo o crescimento vegetativo.

Substrato:

- Utilizar um substrato leve e com boa drenagem.
- **PH** ideal: 5,8 a 6,2.

Temperatura:

- **Temperatura ideal** entre 15°C e 30°C.
- **Evitar** temperaturas extremas.

Infraestrutura:

- **Plástico** difusor ou transparente.
- **Sombreamento** com sombrite ou tela aluminizada em situações de temperaturas extremas.

Ciclo de produção:

- Ø 14 cm – 7 a 8 semanas.
- Ø 21 e 26 cm – 12 a 14 semanas.

Adubação:

- **EC** 1,5 a 2,0 mS/cm.
- **NPK** 17-10-17 ou 20-10-20 (com micronutriente).

Irrigação:

- **Manter** boa umidade do substrato sem encharcar.
- **Preferir** regas pela manhã para reduzir risco de doenças.

Pragas:

- Mosca-branca (*Bemisia tabaci*).
- Mosca-minadora (*Liriomyza huidobrensis*).
- Pulgões (*Aphis* sp., *Myzus* sp. e *Brevicoryne* sp.).
- Tripes (*Thrips* sp. e *Frankliniella* sp.).

Doenças:

- Mildio (*Pseudoperonospora* sp., *Peronospora* sp. e *Plasmopara* sp.).
- Mofo cinzento (*Botrytis* sp.)
- Oídio (*Erysiphe* sp., *Sphaerotheca* sp. e *Oidium* sp.).
- Podridão das raízes (*Pythium* sp.)
- Podridão radicular (*Rhizoctonia* sp.)