


Geranium Pendente



Ball

Pelargonium zonale (L.) L'Hér.

A série Gerânio Pendente apresenta cultivares rústicas de cores tropicais vibrantes. Possui tolerância ao calor e as altas temperaturas do verão. Com excelente desempenho em condições de clima mais ameno, é ideal para uso em varandas, canteiros ou espaços iluminados e abrigados. Pode ser cultivado em bandejas, potes ou cuias 13 a 25.



Geranium Pendente Bicolor Red



Bicolor Red



Orange



Red



Rose



Violet



White

A propagação de cultivar protegida sem autorização é infração prevista na Lei de Proteção de Cultivares (Lei nº 9.456/97) sujeitando o infrator as penalidades legais.

Geranium Pendente

Guia básico de cultivo.

Ball

Pelargonium zonale (L.) L'Hér.

Estação:

- Transplante da semana 1 a 52 (ano todo).

Recebimento dos plugs:

- Transplante imediato após o recebimento dos plugs;
- Evitar exposição à luz solar direta;
- Evitar temperaturas extremas.

Tamanho de pote e pinch:

- Recomenda-se de 1 a 2 pinchs por planta;
- Cuia Ø21 a 25: 3 mudas;
- Potes Ø15, 17: 1 muda;
- Garden (caixaria) 1muda por "saquinho" em caixa com 15 mudas.

Substrato:

- Utilizar um substrato leve e com boa drenagem;
- PH ideal: 5,8 a 6,2.

Temperatura:

- Temperatura ideal entre 18 a 25°C;
- Evitar temperaturas extremas.

Infraestrutura:

- Plástico difusor ou transparente;
- Sombreamento com sombrite ou tela aluminizada em situações de temperaturas extremas.

Ciclo de produção:

- Ø 14 e 17 cm – 10 semanas;
- Ø 25 cm – 11 a 13 semanas.

Adubação:

- EC 1,5 a 2,0 mS/cm;
- NPK 17-10-17 ou 20-10-20 (com micronutriente);
- Nitrogênio: 225-300 ppm N.

Irrigação:

- Manter boa umidade do substrato sem encharcar;
- Preferir regas pela manhã para reduzir risco de doenças.
- Evitar molhar a folhagem excessivamente para prevenir doenças bacterianas e fúngicas.

Pragas:

- Ácaros
- tripses (*Frankliniella schultzei*);
- Mosca-minadora (*Liriomyza huidobrensis*);
- Pulgões (*Aphis* sp., *Myzus* sp. e *Brevicoryne* sp.).

Doenças:

- Crestamento e murcha bacteriana: (*Xanthomonas hortorum* pv. *pelargonii*);
- Mofo cinzento (*Botrytis* sp.);
- Oídio (*Erysiphe* sp., *Sphaerotheca* sp. e *Oidium* sp.);
- Podridão das raízes (*Pythium* sp.);
- Podridão radicular (*Rhizoctonia* sp.).

NOTA: As informações deste folheto têm caráter exclusivamente orientativo. As práticas de manejo podem apresentar resultados diferentes conforme as condições de cultivo, clima, região e época do ano. A Ball Horticultural do Brasil não se responsabiliza pelos resultados obtidos a partir do uso destas informações, tendo em vista as circunstâncias diversas envolvendo o cultivo. Este material não substitui a consulta a um profissional qualificado, tampouco a necessidade de uma avaliação e diagnóstico técnico para a sua aplicação adequada.