

Gerbera Cut

Gerbera jamesonii Bolus ex Hook.f.

Ball

Entre num mundo de cores vibrantes e qualidade superior com o nosso sortimento de gérbetas: criadas especificamente para o mercado de corte, estas flores impressionam pelo seu desempenho fenomenal e ampla gama de cores, com durabilidade excepcional.



Figaro



Alliance



Alma



Avignon



Balance



Brilliance



Capella



Diáblo



Dreamline



Dune



Dynâmico



Estáte




Farao

A propagação de cultivar protegida sem autorização é infração prevista na Lei de Proteção de Cultivares (Lei nº 9.456/97) sujeitando o infrator as penalidades legais.

Gerbera Cut

Gerbera jamesonii Bolus ex Hook.f.

Ball



Figaro



Forza



Inferno



Intense



Mandala



Memphis



Panama



Pink Elegance



Pink Lake



Pink Power



Pole Star



Pre Intezz



Pre Semmy



Snowball



Toast



Wake Up

A propagação de cultivar protegida sem autorização é infração prevista na Lei de Proteção de Cultivares (Lei nº 9.456/97) sujeitando o infrator as penalidades legais.

Gerbera Cut

Guia básico de cultivo.

Gerbera jamesonii Bolus ex Hook.f.

Ball

Estação:

- Transplântio da semana 1 até a semana 52 .

Recebimento dos plugs:

- **Transplante imediato** após o recebimento dos plugs;
- **Evitar** exposição à luz solar direta;
- **Evitar** temperaturas extremas (máximas e mínimas).

Infraestrutura:

- A produção deve ocorrer em ambientes bem iluminados, com boa ventilação e drenagem;
- Cultivada em estufas;
- Necessita de alta luminosidade.

Manejo:

- Com pouca luz ocorre alongamento excessivo das hastes e flores menores.
- Muita luz pode ocasionar queimaduras foliares e estresse térmico, nessas condições recomendamos o uso de sombreamento (50%).
- Utilizar um substrato leve, rico em matéria orgânica e com boa drenagem;
- PH ideal: 5.8 - 6.2.

Temperatura:

- Temperatura ideal de cultivo: entre 15 °C e 30 °C.
- Ambientes ensolarados e bem ventilados

Espaçamento:

- De 7 a 9 mudas por m² . Evitar que as plantas fiquem muito juntas para que haja boa penetração de luz e ventilação.

Adubação:

- **EC** 1,5 a 2,0 mS/cm;
- Formulação 75% Nitrato de potássio e 25% Sulfato de magnésio;
- Alternar ocasionalmente a mistura com um fertilizante equilibrado como 20-20-20 (NPK com micronutrientes).

Colheita:

- As fores devem ser colhidas no período da manhã;
- O diâmetro das flores varia entre 10 e 13 cm a depender da variedade.
- O ponto de colheita é quando as flores estiverem abertas e com o miolo central preservado (disco floral com 2 - 3 fileiras).

Pragas:

- Ácaros (*Tetranychus urticae*).
- Mosca-branca (*Bemisia tabaci*);
- Pulgões (*Aphis gossypii*);
- Tripes (*T. tabaci*. *T. palmi*. *Frankiniella schutzei*).

Doenças:

- *Botrytis* sp.
- Fusário: (*Fusarium* sp.);
- Mildio(*Peronospora manshurica*);
- Oídio (*Erysiphe diffusa*);
- *Phythium* spp.;
- *Rhizoctonia* sp.

Dicas:

- Pode ser plantado em vasos ou diretamente no solo. Em vasos a produtividade costuma ser superior.

NOTA: As informações deste folheto têm caráter exclusivamente orientativo. As práticas de manejo podem apresentar resultados diferentes conforme as condições de cultivo, clima, região e época do ano. A Ball Horticultural do Brasil não se responsabiliza pelos resultados obtidos a partir do uso destas informações, tendo em vista as circunstâncias diversas envolvendo o cultivo. Este material não substitui a consulta a um profissional qualificado, tampouco a necessidade de uma avaliação e diagnóstico técnico para a sua aplicação adequada.