

Gerbera Mini Cut

Gerbera jamesonii Bolus ex Hook.f.

Ball

Entre num mundo de cores vibrantes e qualidade superior com o nosso sortimento de gérbas mini: criadas especificamente para o mercado de corte, estas flores delicadas impressionam pelo seu desempenho fenomenal e ampla gama de cores, com durabilidade excepcional. Apresentam flores menores que o sortimento de gérbas tradicionais.



Mini Cut Boost



Mini Cut Caramba



Mini Cut Colori



Mini Cut Ice Cream



Mini Cut Jacky



Mini Cut Lobby



Mini Cut Masserati



Mini Cut Mickey



Mini Cut Mindset



Mini Cut Okidoki



Mini Cut Sailor



Mini Cut Whity

A propagação de cultivar protegida sem autorização é infração prevista na Lei de Proteção de Cultivares (Lei nº 9.456/97) sujeitando o infrator as penalidades legais.

Gerbera Mini Cut

Guia básico de cultivo.

Gerbera jamesonii Bolus ex Hook.f.

Ball

Estação:

- Transplântio da semana 1 até a semana 52.

Recebimento dos plugs:

- **Transplante imediato** após o recebimento dos plugs;
- **Evitar** exposição à luz solar direta;
- **Evitar** temperaturas extremas (máximas e mínimas).

Infraestrutura:

- A produção deve ocorrer em ambientes bem iluminados, com boa ventilação e drenagem;
- Cultivada em estufas;
- Necessita de alta luminosidade.

Manejo:

- Com pouca luz ocorre alongamento excessivo das hastes e flores menores.
- Muita luz pode ocasionar queimaduras foliares e estresse térmico, nessas condições recomendamos o uso de sombreamento (50%).
- Utilizar um substrato leve, rico em matéria orgânica e com boa drenagem;
- PH ideal: 5.8 - 6.2.

Temperatura:

- Temperatura ideal de cultivo: entre 15 °C e 30 °C.
- Ambientes ensolarados e bem ventilados

Espaçamento:

- De 10 a 15 mudas por m² . Evitar que as plantas fiquem muito juntas para que haja boa penetração de luz e ventilação.

Adubação:

- **EC** 1,5 a 2,0 mS/cm;
- Formulação 75% Nitrato de potássio e 25% Sulfato de magnésio;
- Alternar ocasionalmente a mistura com um fertilizante equilibrado como 20-20-20 (NPK com micronutrientes).

Colheita:

- As fores devem ser colhidas no período da manhã;
- O diâmetro das flores varia entre 7 e 8 cm a depender da variedade.
- O ponto de colheita é quando as flores estiverem abertas e com o miolo central preservado (disco floral com 2 - 3 fileiras).

Pragas:

- Ácaros (*Tetranychus urticae*).
- Mosca-branca (*Bemisia tabaci*);
- Pulgões (*Aphis gossypii*);
- Tripes (*T. tabaci*, *T. palmi*, *Frankiniella schutzei*).

Doenças:

- *Botrytis* sp.
- Fusário: (*Fusarium* sp.);
- Mildio(*Peronospora manshurica*);
- Oídio (*Erysiphe diffusa*);
- *Phythium* spp.
- *Rhizoctonia* sp.

Dicas:

- Pode ser plantado em vasos ou diretamente no solo. Em vasos a produtividade costuma ser superior;

NOTA: As informações deste folheto têm caráter exclusivamente orientativo. As práticas de manejo podem apresentar resultados diferentes conforme as condições de cultivo, clima, região e época do ano. A Ball Horticultural do Brasil não se responsabiliza pelos resultados obtidos a partir do uso destas informações, tendo em vista as circunstâncias diversas envolvendo o cultivo. Este material não substitui a consulta a um profissional qualificado, tampouco a necessidade de uma avaliação e diagnóstico técnico para a sua aplicação adequada.