

Snapdragon Monaco

Antirrhinum majus L.

Baill

Pertencente ao grupo 2, a série Monaco apresenta excelente desempenho em condições de dias moderados, níveis médios de luminosidade e temperaturas entre 16 e 20 °C. São plantas precoces, indicadas para plantio no inverno, com flores vistosas em hastes longas e ótimo desempenho ao longo do ano em regiões de clima moderado.



A propagação de cultivar protegida sem autorização é infração prevista na Lei de Proteção de Cultivares (Lei nº 9.456/97) sujeitando o infrator as penalidades legais.

Snapdragon Monaco

Guia básico de cultivo.

Antirrhinum majus L.

Ball

Estação:

- Transplante da semana 10 a 25.

Recebimento dos plugs:

- Transplante imediato após o recebimento dos plugs.
- Evitar exposição à luz solar direta.
- Evitar temperaturas extremas (máximas e mínimas).

Espaçamento:

- Densidade de 86-108 plantas/m²

Substrato:

- Utilizar um substrato leve e com boa drenagem.
- PH ideal: 5,8 a 6,2.

Temperatura e grupo:

- **Temperatura ideal** entre 16 e 20 °C.
- **Evitar** temperaturas extremas.
- **Grupo 2**

Infraestrutura:

- **Plástico** difusor ou transparente.
- **Sombreamento** com sombrite ou tela aluminizada em situações de temperaturas extremas.
- Necessário rede de tutoramento para conduzir as hastes florais.

Adubação:

- **EC** 1,2 a 1,5 mS/cm.
- Fertilização equilibrada com NPK 20-10-20 ou 17-5-17, com micronutrientes.
- Fertilização constante com 175 a 225 ppm de Nitrogênio (N).

Colheita e pós colheita:

- Colher quando as hastes estiverem com de 5 a 6 flores abertas;
- É recomendado o uso de inibidores de etileno no pós colheita para aumentar a durabilidade e homogeneizar a abertura das flores;
- Hidratar e armazenar entre 2 e 5° C.
- As flores devem ser armazenadas sempre verticalmente para que as hastes não entortem.

Pragas:

- Tripes (*Frankliniella schultzei*)
- Mosca-minadora (*Liriomyza huidobrensis*).
- Pulgões (*Aphis* sp., *Myzus* sp. e *Brevicoryne* sp.).

Doenças:

- Míldio (*Plasmopora* sp.)
- Mofo cinzento (*Botrytis* sp.)
- Oídio (*Erysiphe* sp., *Sphaerotheca* sp. e *Oidium* sp.).

NOTA: As informações deste folheto têm caráter exclusivamente orientativo. As práticas de manejo podem apresentar resultados diferentes conforme as condições de cultivo, clima, região e época do ano. A Ball Horticultural do Brasil não se responsabiliza pelos resultados obtidos a partir do uso destas informações, tendo em vista as circunstâncias diversas envolvendo o cultivo. Este material não substitui a consulta a um profissional qualificado, tampouco a necessidade de uma avaliação e diagnóstico técnico para a sua aplicação adequada.