



A série Vinca Tattoo apresenta cores e mesclas únicas, de beleza tropical, as variedades apresentam tolerância ao calor e as altas temperaturas do verão. Excelente desempenho em condições de clima úmido e quente. Ideal para uso em varandas ou espaços iluminados e abrigados, não sendo indicado para canteiros ou áreas desprotegidas, Pode ser cultivado do pote 11 ao 20 e com excepcional performance em cuias pendentes.



A propagação de cultivar protegida sem autorização é infração prevista na Lei de Proteção de Cultivares (Lei nº 9.456/97) sujeitando o infrator as penalidades legais.

Estação:

- **Plantio:** Primavera, Verão e Outono.
- **Obs:** em regiões de temperaturas mais frias, no inverno as folhas podem amarelar e prejudicar o ciclo.
- **Ciclo:** 7 a 8 semanas.

Recebimento dos plugs:

- **Transplante imediato** após o recebimento dos plugs.
- **Evitar** exposição à luz solar direta.
- **Evitar** temperaturas extremas (máximas e mínimas).

Tamanho de pote e pinch:

- Ø11-15 cm (Pote 15) - 1 planta por vaso - Pode-se fazer Pinch.
- Cuia Ø21-25 cm - 3 a 4 plantas por vaso - Pode-se fazer Pinch.
- **Pinch:** Não é necessário, mas pode ser realizado.

Substrato:

- **Características:** Muito bem drenado e aerado.
- **pH ideal:** 5.8 a 6.0.

Temperatura:

- **Temperatura** ideal entre 24°C e 32°C (Dia) e acima de 19°C (Noite).
- **Evitar** temperaturas abaixo de 15°C (Causa amarelamento e enrolamento das folhas).

Iluminação:

- **Sol Pleno** (Alta luminosidade).
- **Diferencial:** A alta intensidade de luz e o calor aumentam o contraste da cor "tatuada" nas pétalas.

Adubação:

- **EC:** 1.0 a 1.5 mS/cm (SME).
- **Fórmula:** NPK 20-10-20 ou 15-5-15 (Alternar com fertilizante rico em Cálcio/Magnésio).
- **Evitar:** Níveis muito altos de Amônio.

Controle de crescimento:

- Geralmente não necessário se cultivada no seco e com alta luz. Se preciso, aceita daminozida.
- **Não usar paclobutrazol pois pode causar fito.**

Pragas:

- Fungus Gnats (*Bradysia* sp.)
- Pulgões (*Aphis* sp.).
- Tripes (*Frankliniella occidentalis*).

Doenças:

- Podridão de Raiz (*Pythium* sp., *Phytophthora* sp.)
- Podridão Negra das Raízes (*Thielaviopsis* sp.)
- Tombamento (*Rhizoctonia* sp.)

Dicas:

- Embora tolere calor, o cultivo protegido ajuda a evitar excesso de umidade nas folhas, prevenindo doenças.

NOTA: As informações deste folheto têm caráter exclusivamente orientativo. As práticas de manejo podem apresentar resultados diferentes conforme as condições de cultivo, clima, região e época do ano. A Ball Horticultural do Brasil não se responsabiliza pelos resultados obtidos a partir do uso destas informações, tendo em vista as circunstâncias diversas envolvendo o cultivo. Este material não substitui a consulta a um profissional qualificado, tampouco a necessidade de uma avaliação e diagnóstico técnico para a sua aplicação adequada.