

Gypsophila


Gypsophila paniculata L.

Ball

O sortimento de Gypsophila da Ball foi cuidadosamente desenvolvido para reunir as variedades mais adaptadas às nossas condições de cultivo, priorizando sempre alta produtividade e longevidade das plantas. A tradicional Dynamic Love destaca-se por sua excelente durabilidade e boa tolerância à poda. Já sua versão aprimorada, Dynamic Love Imp, mantém essas qualidades desejáveis, oferecendo flores ligeiramente maiores e maior precocidade.



Dynamic Love



Dynamic Love Improved

A propagação de cultivar protegida sem autorização é infração prevista na Lei de Proteção de Cultivares (Lei nº 9.456/97) sujeitando o infrator as penalidades legais.

Gypsophila

Guia básico de cultivo.

Gypsophila paniculata L.

Ball

Estação:

- Transplântio da semana 1 até a semana 52.

Recebimento dos plugs:

- **Transplante imediato** após o recebimento dos plugs.
- **Evitar** exposição à luz solar direta.
- **Evitar** temperaturas extremas (máximas e mínimas).

Infraestrutura:

- A produção deve ocorrer em ambientes bem iluminados, com boa ventilação e drenagem.
- Cultivada em estufas.
- Necessita de pleno sol ou, em estufas, alta luminosidade difusa.

Manejo:

- Poda de condução: Recomenda-se realizar um pinch após 25 a 30 dias na haste apical.
- O manejo da luminosidade e do fotoperíodo é essencial: sob dias curtos, ocorre atraso na floração.
- Após a primeira colheita, é possível obter reflorescimento com boa qualidade, realizando poda adequada e adubação de recuperação.

Temperatura e luminosidade:

- Temperatura ideal de cultivo: entre 15 °C e 30 °C
- Alta luminosidade difusa.

Adubação:

- Utilizar adubação equilibrada, com enfoque em Cálcio e Potássio, essenciais para firmeza de caule e durabilidade da flor.
- Evitar excesso de Nitrogênio, que causa alongamento excessivo e fragilidade de hastes.
- Recomenda-se fertirrigação semanal alternando fórmulas balanceadas (ex.: 20-20-20 e 15-5-30).

Espaçamento:

- Em campo: 20 × 25 cm ou 25 × 25 cm, conforme o porte da variedade.

Pragas:

- Ácaros (*Tetranychus urticae*).
- Mosca-branca (*Bemisia tabaci*).
- Tripes (*Frankliniella occidentalis*).
- Pulgões (*Aphis gossypii*).

Doenças:

- Amarelão (*Pythium* spp.).
- Fusariose (*Fusarium* spp.).
- Mofo Cinzento (*Botrytis cinerea*).
- Podridão Radicular (*Rhizoctonia solani*).

Dicas:

- Evite excesso de sombreamento para garantir ramificações firmes e flores bem formadas.
- Após a colheita, coloque as hastes imediatamente em solução conservante, para prolongar a durabilidade.
- O uso de reguladores de crescimento geralmente não é necessário, mas pode-se aplicar em casos de estiolamento.

NOTA: As informações deste folheto têm caráter exclusivamente orientativo. As práticas de manejo podem apresentar resultados diferentes conforme as condições de cultivo, clima, região e época do ano. A Ball Horticultural do Brasil não se responsabiliza pelos resultados obtidos a partir do uso destas informações, tendo em vista as circunstâncias diversas envolvendo o cultivo. Este material não substitui a consulta a um profissional qualificado, tampouco a necessidade de uma avaliação e diagnóstico técnico para a sua aplicação adequada.