


Impatiens CL-CT

Impatiens hawkeri W. Bull

Ball

A série CL-CT Mix oferece cores sólidas e vibrantes. Composta por variedades vigorosas com boa ramificação e floração. Ideal para jardins de meia-sombra e sombra. Excelente performance nas estufas de produção. Pode ser cultivado do pote 10 ao 15.



A propagação de cultivar protegida sem autorização é infração prevista na Lei de Proteção de Cultivares (Lei nº 9.456/97) sujeitando o infrator as penalidades legais.

Impatiens CL-CT

Guia básico de cultivo.

Impatiens hawkeri W. Bull

Ball

Estação:

- **Plantio:** Inverno, Outono, Primavera e Verão.
- **Ciclo:** 7 a 9 semanas (Pote 13) ou 9 a 10 semanas (Pote 15) após transplante.

Recebimento dos plugs:

- **Transplante imediato** após o recebimento dos plugs.
- **Evitar** exposição à luz solar direta.
- **Evitar** temperaturas extremas (máximas e mínimas).

Tamanho de pote e pinch:

- **Ø10-13 cm** (Pote 13) - 1 planta por vaso - Sem pinch.
- **Ø15 cm** (Pote 15) - 1 a 2 plantas por vaso - Sem pinch.
- **Cuia 25-30 cm** - 3 a 5 plantas por vaso - Sem pinch.
- **Pinch:** Não necessário (Genética de auto-ramificação).

Substrato:

- Utilizar substrato bem drenado.
- **pH ideal:** 5.8 a 6.2.
- **Evitar** excesso de micronutrientes no solo.

Temperatura:

- **Temperatura ideal** entre 18 °C a 24 °C.
- **Manejo:** Manter temperatura média diária de 20°C otimiza o tamanho da flor. Temperaturas mais frias atrasam o ciclo.

Iluminação:

- **Sombra / Meia Sombra.**
- **Tolerância:** Aceita níveis de luz moderados se a umidade for mantida.

Adubação:

- **EC: Nível: Moderado a Alto.**
- **Fórmula:** NPK 175 a 225 ppm Nitrogênio.
- **Recomendação:** Usar fertilizante balanceado.

Irrigação:

- Evitar o estresse hídrico em todos os estágios da cultura. Manter o solo úmido, mas sem encharcamento.

Controle de crescimento:

- **PGR:** Geralmente não necessário com boas práticas de cultivo (controle hídrico e luz adequada).
- **Se preciso:** Usar no início para hábito; ou na fase final para altura.
- **Rega:** Cultivar levemente seco ("Dry side") ajuda a controlar a altura e acelera a floração.

Pragas:

- Ácaros (*Tetranychus* spp.).
- Pulgões (Aphids spp.).
- Tripes (*Frankliniella occidentalis* e *Thrips* spp.).

Doenças:

- Botrytis / Mofo Cinzento (*Botrytis cinerea*)
- INSV (Impatiens Necrotic Spot Virus)
- Podridão de Raiz (*Pythium* spp.).

NOTA: As informações deste folheto têm caráter exclusivamente orientativo. As práticas de manejo podem apresentar resultados diferentes conforme as condições de cultivo, clima, região e época do ano. A Ball Horticultural do Brasil não se responsabiliza pelos resultados obtidos a partir do uso destas informações, tendo em vista as circunstâncias diversas envolvendo o cultivo. Este material não substitui a consulta a um profissional qualificado, tampouco a necessidade de uma avaliação e diagnóstico técnico para a sua aplicação adequada.