

Impatiens Glimmer

Impatiens walleriana Hook. fil.

Ball

O Glimmer é o novo e surpreendente Impatiens dobrado que chega ao mercado. Destacando-se pelas flores dobradas e numerosas, suas 6 cores chamativas atraem a atenção de qualquer pessoa. Além de sua beleza única, é o primeiro Impatiens com elevada resistência ao míldio, trazendo mais eficiência ao produtor. Ideal para ambientes de meia sombra e bem iluminados, pode ser cultivado em potes do tamanho 11 ao 15 ou em cuias e floreiras do tamanho 21 a 26.



Glimmer Hot Pink



Glimmer Salmon



Glimmer Appleblossom



Salmon



White




Hot Pink



Appleblossom



Bright Red



Burgundy

A propagação de cultivar protegida sem autorização é infração prevista na Lei de Proteção de Cultivares (Lei nº 9.456/97) sujeitando o infrator as penalidades legais.

Impatiens Glimmer

Guia básico de cultivo.

Impatiens walleriana Hook. fil.

Ball

Estação:

- Primavera, Verão e Outono (Ano todo em clima protegido).
- **Ciclo:** Rápido. De 7 a 9 semanas para Pote 15 ou 9 a 12 semanas para Cuias (após o transplante).

Recebimento dos plugs:

- **Transplante imediato** após o recebimento dos plugs.
- **Evitar** exposição à luz solar direta.
- **Evitar** temperaturas extremas (máximas e mínimas).

Tamanho de pote e pinch:

- **Pote Ø 11-13 cm:** 1 planta por vaso - 5 a 7 semanas - Sem pinch.
- **Pote Ø 15 cm:** 1 a 2 plantas por vaso - 6 a 8 semanas - Pinch opcional.
- **Cuias 21-26 cm:** 4 a 5 plantas por cuia - 9 a 12 semanas - Pinch recomendado para melhor preenchimento.

Temperatura:

- **Temperatura ideal** entre 20°C e 24°C (Dia) e 13°C a 16°C (Noite).
- **Evitar** estresse por frio (abaixo de 18°C à noite no início do ciclo) e calor excessivo que possa abortar botões.

Iluminação:

- **Sombra / Meia Sombra**
- **Proteção:** Proteger do sol direto do meio-dia para evitar queimaduras nas flores delicadas.

Substrato:

- **Características:** Leve e bem drenado (Turfa/Perlita).
- **pH ideal:** 5.8 a 6.2.

Adubação:

- **EC:** Manter acima de 1.0 mS/cm (Método SME) para garantir vigor e tamanho de flor.
- **Fórmula:** NPK 175 a 225 ppm N. Usar fórmulas balanceadas (ex: 20-10-20 ou 15-5-15).
- **Atenção:** Manter níveis adequados de micronutrientes para garantir a qualidade da folhagem e flor.

Controle de crescimento:

- **PGR:** Se necessário, responde bem a Daminozida (B-Nine) spray (2.500 ppm) ou Paclobutrazol (Bonzi) spray (5-10 ppm). Em regiões quentes, doses maiores podem ser necessárias, mas sempre testar antes.
- **Manejo:** Evitar estresse hídrico (seca) em qualquer estágio.

Pragas:

- Ácaros (*Tetranychus* spp.)
- Larva Minadora (*Liriomyza* spp.)
- Tripes (*Frankliniella occidentalis* e *Thrips* spp.).

Doenças:

- Botrytis / Mofo Cinzento (*Botrytis cinerea*)
- Míldio (*Plasmopara destructor*).
- Podridão de Raiz (*Pythium* spp.)
- Vírus (INSV e TSWV).

NOTA: As informações deste folheto têm caráter exclusivamente orientativo. As práticas de manejo podem apresentar resultados diferentes conforme as condições de cultivo, clima, região e época do ano. A Ball Horticultural do Brasil não se responsabiliza pelos resultados obtidos a partir do uso destas informações, tendo em vista as circunstâncias diversas envolvendo o cultivo. Este material não substitui a consulta a um profissional qualificado, tampouco a necessidade de uma avaliação e diagnóstico técnico para a sua aplicação adequada.