

Lantana Lucky

Lantana camara L.

Ball

A série Lantana Lucky apresenta um crescimento compacto e vibrante, destacando pela excelente tolerância ao calor, seca e outras condições de estresse. Suas flores possuem durabilidade superior em comparação a outras variedades disponíveis no mercado, além de exibirem cores únicas, como vermelho e rosa intenso, juntamente com os dois novos lançamentos: Branco e amarelo. Pode ser cultivada em jardins, vasos de 11 a 20 cm e cuias.



A propagação de cultivar protegida sem autorização é infração prevista na Lei de Proteção de Cultivares (Lei nº 9.456/97) sujeitando o infrator as penalidades legais.

Lantana Lucky

Guia básico de cultivo.

Lantana camara L.

Ball

Estação:

- **Transplântio** da semana 1 a 52 (ano todo)

Recebimento dos plugs:

- **Transplante imediato** após o recebimento dos plugs.
- **Evitar** exposição à luz solar direta.
- **Evitar** temperaturas extremas (máximas e mínimas).

Tamanho de pote e pinch:

- Ø11 cm - 1 planta por vaso - 1 pinch.
- Ø15 cm - 2 plantas por vaso - 2 pinch.
- Ø21 a 26 cm - 3 plantas por cuia - 3 pinch.
- Floreiras e jardins.

Pinches adicionais apenas se necessário para uniformizar o lote.

Substrato:

- Utilizar um substrato leve e com boa drenagem.
- **PH** ideal: 5,8 a 6,2.

Temperatura:

- **Temperatura ideal** entre 18 °C e 28 °C.
- **Tolera** altas temperaturas, até 35 °C, mantendo boa performance.
- Abaixo de 15 °C, o crescimento desacelera e a floração reduz.

Iluminação:

- Pleno sol (mínimo de 6 h diárias).
- A intensidade do sol aumenta o número de flores e deixa as cores mais vibrantes.

Adubação:

- **EC** 1,5 a 2,0 mS/cm.
- Fertilização equilibrada com NPK 20-10-20 ou 17-5-17, com micronutrientes.
- Aumentar potássio (K) na fase de floração para intensificar cor e durabilidade.
- Evitar excesso de nitrogênio (N), que favorece crescimento vegetativo em detrimento da floração.

Controle de crescimento:

- O uso de regulador de crescimento pode ser necessário durante o ciclo de produção, dependendo do porte desejado da planta e das condições de cultivo

Pragas:

- Ácaro-rajado (*Tetranychus urticae*)
- Mosca-branca (*Bemisia tabaci*, *Trialeurodes vaporariorum*)
- Pulgões (*Aphis gossypii*)
- Trips (*Frankliniella occidentalis*)

Doenças:

- Mofo Cinzento (*Botrytis cinerea*)
- Oídio (*Erysiphe cichoracearum*)
- Podridão de raiz (*Pythium* sp., *Rhizoctonia solani*, *Phytophthora* sp.)

NOTA: As informações deste folheto têm caráter exclusivamente orientativo. As práticas de manejo podem apresentar resultados diferentes conforme as condições de cultivo, clima, região e época do ano. A Ball Horticultural do Brasil não se responsabiliza pelos resultados obtidos a partir do uso destas informações, tendo em vista as circunstâncias diversas envolvendo o cultivo. Este material não substitui a consulta a um profissional qualificado, tampouco a necessidade de uma avaliação e diagnóstico técnico para a sua aplicação adequada.