


Samambaias



Ball

Adiantum L., *Asplenium* L., *Davallia* Sm., *Hemionitis* L., *Nephrolepis* Schott,
Platycterium Desv.

O sortimento de samambaias da Ball reúne 20 espécies, incluindo *Adiantum*, *Asplenium*, *Davallia*, *Hemionitis*, *Nephrolepis* e *Platycterium*, com hábitos, cores, formatos e tamanhos variados. São ideais para jardins sombreados ou ambientes internos bem iluminados, vasos ou como plantas pendestes, proporcionando leveza, volume e um visual naturalmente elegante.



Adiantum 'Fritz Luthii'



Asplenium 'Crispy Wave'



Asplenium 'Crispie'



Asplenium 'Hurricane'



Asplenium 'Parvati'



Asplenium 'Victoria'



Davallia 'Rabbit Foot
Fern'



Davallia 'Hare's Foot
Fern'



Hemionitis 'Heart
Fern'

A propagação de cultivar protegida sem autorização é infração prevista na Lei de Proteção de Cultivares (Lei nº 9.456/97) sujeitando o infrator as penalidades legais.

Samambaias

Adiantum L., Asplenium L., Davallia Sm., Hemionitis L., Nephrolepis Schott, Platycerium Desv.

Ball



Nephrolepis 'Duffii'



Nephrolepis 'Emina'



Nephrolepis 'Fish Tail'



Nephrolepis 'Fluffy Ruffles'



Nephrolepis 'Macho'



Nephrolepis 'Murano'



Nephrolepis 'Nevada'



Nephrolepis 'Petticoat'



Nephrolepis 'Pom Pom'



Nephrolepis 'Sword Fern'




Nephrolepis 'Tiger'



Platycerium 'Netherlands'

A propagação de cultivar protegida sem autorização é infração prevista na Lei de Proteção de Cultivares (Lei nº 9.456/97) sujeitando o infrator as penalidades legais.

Samambaias



Ball

Guia básico de cultivo.

Adiantum L., Asplenium L., Davallia Sm., Hemionitis L., Nephrolepis Schott, Platycerium Desv.

Estação:

- Transplântio da semana 1 até a semana 52.

Recebimento dos plugs:

- Transplante imediato após o recebimento dos plugs;
- Evitar exposição à luz solar direta;
- Evitar temperaturas extremas (máximas e mínimas).

Tamanho de pote e pinch:

- Não há necessidade de de *pinch*, mas fica a critério do produtor;
- Ø10 cm: 1 planta por vaso.
- Ø15 cm: 2 - 3 plantas por vaso.
- Ø20 cm: 3 plantas por vaso
- Ø27 cm: 3 - 4 plantas por vaso.

Luminosidade:

- Não tolera sol direto. Deve ser cultivada a meia-sombra ou em interiores bem iluminados.

Manejo:

- Apresenta baixo índice de manutenção, podendo ser eventualmente realizada a remoção de folhas velhas.

Temperatura:

- Temperatura ideal de cultivo: entre 17°C e 26 °C, mas tolera temperaturas mais elevadas mantendo uma boa performance.

Adubação:

- EC 1,2 - 1,5 mS/cm;
- Fertilização alternada entre um fertilizante à base de cálcio (ex.: 14-4-14) e um fertilizante amoniacal equilibrado (ex.: 17-5-17), na concentração de 80–120 ppm de N;

Pragas:

- Ácaros (*Tetranychus* spp.)
- Lagartas (*Spodoptera* spp.)
- Pulgões (*Aphis* sp., *Myzus* sp. e *Brevicoryne* sp.);
- Tripes (*Thrips* sp. e *Frankliniella* sp.).

Doenças:

- Antracnose (*Colletotrichum* spp.)
- Ferrugem (*Puccinia* spp.)
- Mancha foliar (*Cercospora* spp.)
- Oídio (*Oidium* spp.)
- Podridão radicular (*Pythium* spp.)

NOTA: As informações deste folheto têm caráter exclusivamente orientativo. As práticas de manejo podem apresentar resultados diferentes conforme as condições de cultivo, clima, região e época do ano. A Ball Horticultural do Brasil não se responsabiliza pelos resultados obtidos a partir do uso destas informações, tendo em vista as circunstâncias diversas envolvendo o cultivo. Este material não substitui a consulta a um profissional qualificado, tampouco a necessidade de uma avaliação e diagnóstico técnico para a sua aplicação adequada.