

Torenia Kauai Mix ☀

Ball

Torenia fournieri Linden ex E. Fourn.

A série Kauai oferece uma seleção completa com cores mais vibrantes. O manejo da cultura é mais fácil e econômico com esta torenia compacta. Apresenta desempenho superior sob calor e umidade extremos. Proporciona um visual exótico a jardins pequenos, com sua ampla gama de cores; também é adequada para vasos, sempre à meia sombra.



Torenia Quartz Mix

A propagação de cultivar protegida sem autorização é infração prevista na Lei de Proteção de Cultivares (Lei nº 9.456/97) sujeitando o infrator as penalidades legais.

Estação:

- **Plantio:** Primavera e Verão.
- **Ciclo:** 5 a 10 semanas, dependendo do tamanho do pote escolhido e da série cultivada.

Recebimento dos plugs:

- **Transplante imediato** após o recebimento dos plugs.
- **Evitar** exposição à luz solar direta.
- **Evitar** temperaturas extremas (máximas e mínimas).

Tamanho de pote e pinch:

- Ø11-12 cm - 1 planta por vaso.
- Ø15- cm - 2 a 3 plantas por vaso.
- **Pinch:** Não é recomendado.

Substrato:

- **Características:** Muito bem drenado e aerado.
- **pH ideal:** 5.5 a 6.0.

Temperatura:

- **Temperatura** ideal entre 18°C e 21°C (Dia) e acima de 17°C (Noite).

Iluminação:

- **Pleno sol e Meia sombra.**
- **Diferencial:** Kauai tem resposta Neutra ao fotoperíodo.
- **Ponto Crítico:** Níveis de luz extremamente altos podem causar queima nas folhas.

Adubação:

- **EC:** 0.5 a 0.75 mS/cm na fase inicial de plug, subindo para um alvo de 0.9 a 2.0 mS/cm na fase de crescimento.
- Entre **75 a 225 ppm** de Nitrogênio na fase de crescimento, ajustando conforme a necessidade específica de vigor da série escolhida.

Controle de crescimento:

- Devido à genética compacta, o uso de reguladores geralmente não é necessário.
- **Evite** o uso de Daminozida (B-Nine) na Kauai, pois ela branqueia a cor das flores e atrasa significativamente a floração.

Pragas:

- Pulgões (*Aphis* sp.).
- Tripes (*Frankliniella occidentalis*).

Doenças:

- *Botrytis* sp.
- Podridão de Raiz (*Pythium* sp., *Phytophthora* sp.)
- Podridão Negra das Raízes (*Thielaviopsis* sp.)

NOTA: As informações deste folheto têm caráter exclusivamente orientativo. As práticas de manejo podem apresentar resultados diferentes conforme as condições de cultivo, clima, região e época do ano. A Ball Horticultural do Brasil não se responsabiliza pelos resultados obtidos a partir do uso destas informações, tendo em vista as circunstâncias diversas envolvendo o cultivo. Este material não substitui a consulta a um profissional qualificado, tampouco a necessidade de uma avaliação e diagnóstico técnico para a sua aplicação adequada.