


Verbena Quartz Mix ☀

Verbena ×hybrida hort. ex Groenl. & Rümpler

Ball

As Verbenas Quartz apresentam excelente uniformidade e desempenho superior no jardim, superando variedades concorrentes. Florescem de forma precoce com ramificação significativamente melhor e entrenós mais curtos, resultando em um hábito mais cheio e contido. As plantas, levemente prostradas e de porte arredondado, formam canteiros vibrantes e se projetam elegantemente sobre as bordas de vasos e recipientes suspensos.



A propagação de cultivar protegida sem autorização é infração prevista na Lei de Proteção de Cultivares (Lei nº 9.456/97) sujeitando o infrator as penalidades legais.

Verbena Quartz Mix

Guia básico de cultivo.

Verbena xhybrida hort. ex Groenl. & Rümpler

Ball

Estação e Ciclo:

- **Primavera, verão e outono.**
- **Ciclo:** 6 a 8 semanas,

Recebimento dos plugs:

- Transplante imediato após o recebimento dos plugs;
- Evitar exposição à luz solar direta;
- Evitar temperaturas extremas.

Tamanho de pote e pinch:

- **Pinch:** Não obrigatório.
- **Potes Ø10, 15:** 1 muda por pote.
- **Espaçamento:** No canteiro ou paisagismo, o espaçamento ideal é de 25 a 36 cm entre as plantas.

Substrato:

- Utilizar um substrato leve e com boa drenagem;
- **PH** ideal: 5,8 e 6,2.

Temperatura:

- **Temperatura ideal** entre 18 a 21°C durante o dia e cerca de 16°C pela noite.

Infraestrutura:

- **Plástico** difusor ou transparente;
- Deve ser cultivada a pleno sol.

Iluminação:

- **Exposição:** Sol pleno.
- **Fotoperíodo:** É uma planta de dia longo facultativo.

Adubação:

- **EC:** 0.5 a 0.7 mmhos/cm no início e 1.5 a 2.0 mmhos/cm na fase final de crescimento.
- **Dosagem:** 175 a 225 ppm de Nitrogênio na fase de crescimento.

Irrigação:

- **Manter** boa umidade do substrato sem encharcar.

Controle de Crescimento:

- **PRG:** Recomenda-se o uso de Daminozida a 3.500 ppm como spray foliar ou 2 aplicações de Ancimidol a 20 ppm como spray foliar.

Pragas:

- Ácaros (*Tetranychidae* spp.)
- Tripes (*Thysanoptera* spp.)
- Mosca-branca (*Aleyrodidae* spp.)
- Pulgões (*Aphis gossypii*).

Doenças:

- Mildio (*Peronospora* spp.)
- Oídio (*Podosphaera* spp.)
- Podridão radicular (*Rhizoctonia* sp. e *Pythium* sp.).

NOTA: As informações deste folheto têm caráter exclusivamente orientativo. As práticas de manejo podem apresentar resultados diferentes conforme as condições de cultivo, clima, região e época do ano. A Ball Horticultural do Brasil não se responsabiliza pelos resultados obtidos a partir do uso destas informações, tendo em vista as circunstâncias diversas envolvendo o cultivo. Este material não substitui a consulta a um profissional qualificado, tampouco a necessidade de uma avaliação e diagnóstico técnico para a sua aplicação adequada.