



Dahlia Figaro Mix

Dahlia x hybrida.




Ball

A série Figaro de Dálias é composta por plantas de qualidade superior (premium pack), ideais para bordaduras e vasos. São plantas de crescimento rápido com um hábito compacto e denso, perfeitas para criar um jardim colorido e duradouro. Com qualidade premiada, apresentam floração 100% composta por flores semidobradas e dobradas, semelhantes a margaridas, contém diversos tons e nuances da mesma cor, garantindo um visual deslumbrante.



A propagação de cultivar protegida sem autorização é infração prevista na Lei de Proteção de Cultivares (Lei nº 9.456/97) sujeitando o infrator as penalidades legais.

Dahlia Figaro Mix



Ball

Guia básico de cultivo.

Dahlia x hybrida.

Estação e Ciclo:

- **Primavera, verão e outono.**
- **Plantio programado:** Semanas 1 a 52.
- **Ciclo:** 5 a 6 semana.

Recebimento dos plugs:

- **Transplante imediato** após o recebimento dos plugs.
- **Evitar** temperaturas extremas (máximas e mínimas).

Tamanho de pote e pinch:

- Ø 10 -13 cm - 1 planta por vaso.
- **Garden:** mesmo padrão do Alyssun.
- **Pinch:** não obrigatório.

Substrato:

- **Características:** Bem drenado e aerado é fundamental para evitar apodrecimento de raízes.
- **PH ideal:** 5,5 a 5,8.

Temperatura:

- **Temperatura ideal:** Dia: 20°C a 23°C. Noite: 11°C a 16°C.
- **Ponto Crítico:** É uma planta de dias longos (verão) não plantamos a variedade em dias curtos (inverno).

Iluminação:

- **Sol pleno e Meia sombra.**
- **Fotoperíodo:** É uma Planta de Dia Longo Obrigatório. O comprimento do dia ideal é entre 12 e 14 horas.
- **Riscos:** Dias curtos causarão a formação de tubérculos.

Adubação:

- **EC:** 0.5 a 0.75 mmhos/cm no início da germinação, subindo para um alvo de 0.75 a 1.0 mmhos/cm na fase final de acabamento.
- **Dosagem:** 225 a 300 ppm de Nitrogênio na fase de crescimento, com aplicações recomendadas a cada duas semanas.

Irrigação:

- **Riscos:** Evite extremos. Tanto a secagem excessiva quanto o encharcamento prejudicam o sistema radicular e afetam a qualidade e o tempo de finalização da planta.

Controle de crescimento:

- **Sensibilidade Química:** As plantas podem ser controladas com o uso de Paclobutrazol e Daminozida.
- **Manejo Recomendado:** A cultivar é muito responsiva à Daminozida (B-Nine/Alar).

Pragas:

- **Ácaros rajados** (*Tetranychus* spp.)
- **Pulgões** (*Aphis* spp. e *Myzus* spp.)
- **Tripes** (*Frankliniella* spp. e *Thrips* spp.).

Doenças:

- **Botrytis ou Mofo-cinzento** (*Botrytis cinerea*)
- **Oídio** (*Golovinomyces* spp. ou *Podosphaera* spp.).

NOTA: As informações deste folheto têm caráter exclusivamente orientativo. As práticas de manejo podem apresentar resultados diferentes conforme as condições de cultivo, clima, região e época do ano. A Ball Horticultural do Brasil não se responsabiliza pelos resultados obtidos a partir do uso destas informações, tendo em vista as circunstâncias diversas envolvendo o cultivo. Este material não substitui a consulta a um profissional qualificado, tampouco a necessidade de uma avaliação e diagnóstico técnico para a sua aplicação adequada.