Gerbera Cut Marimo

Gerbera jamesonii Bolus ex Hook.f.

Conheça a Gerbera Marimo™, uma gérbera inovadora e única no mercado. Destacando o coração da flor, ela apresenta uma forma arredondada inconfundível, combinando um visual autêntico com qualidade consistente e excepcional durabilidade em vaso.





A propagação de cultivar protegida sem autorização é infração prevista na Lei de Proteção de Cultivares (Lei nº 9.456/97) sujeitando o infrator as penalidades legais.

Gerbera Cut Marimo

Guia básico de cultivo.

Gerbera jamesonii Bolus ex Hook.f.

Estação:

- Transplantio da semana 1 até a semana 52 .

Recebimento dos plugs:

- **Transplanteimediato** após o recebimento dos plugs;
- **Evitar** exposição à luz solar direta;
- **Evitar** temperaturas extremas (máximas e mínimas).

Infraestrutura:

- Aprodução deve ocorrer em ambientes bem iluminados, com boa ventilação e drenagem;
- Cultivada em estufas;
- Necessita de alta luminosidade.

Manejo:

- Com pouca luz ocorre alongamento excessivo das hastes e flores menores.
- Muita luz pode ocasionar queimaduras foliars e estresse térmico, nessas condições recomendamos o uso de sombreamento (50%).
- Utilizar um substrato leve, rico em matéria orgânica e com boa drenagem;
- PH ideal: 5.8 - 6.2.

Temperatura:

- Temperaturaideal de cultivo: entre 15 °C e 30 °C.
- Ambientes ensolarados e bem ventilados

Espaçamento:

- De 7 a 9 mudas por m^2. Evitar que as plantas fiquem muito juntas para que haja boa penetração de luz e ventilação.

Adubação:

- **EC**1,5 a 2,0 mS/cm;
- Formulação 75% Nitrato de potássio e 25% Sulfato de magnésio;
- Alternar ocasionalmente a mistura com um fertilizante equilibrado como 20-20-20 (NPK com micronutrientes).

Colheita:

- As fores devem ser colhidas no período da manhã;
- O diâmetro das flores varia entre 10 e 13 cm a depender da variedade.
- O ponto de colheita é quando as flores estiverem abertas e com o miolo central preservado (disco floral com 2 - 3 fileiras).

Pragas:

- Ácaros (*Tetranychus urticae*).
- Mosca-branca (*Bemisia tabaci*);
- Pulgões (*Aphis gossypii*);
- Tripes (*T. tabaci. T. palmi. schutzei*).

Doenças:

- *Botrytis* sp.
- Fusário: (*Fusarium* sp.)*;*
- Mildio*(Peronospora manshurica)*;
- Oídio (*Erysiphe diffusa*);
- *Phythium* spp.*;*
- *Rhizoctonia* sp.

Dicas:

- Pode ser plantado em vasos ou diretamente no solo. Em vasos a produtividade costuma ser superior.

NOTA: As informações deste folheto têm caráter exclusivamente orientativo. As práticas de manejo podem apresentar resultados diferentes conforme as condições de cultivo, clima, região e época do ano. A Ball Horticultural do Brasil não se responsabiliza pelos resultados obtidos a partir do uso destas informações, tendo em vista as circunstâncias diversas envolvendo o cultivo. Este material não substitui a consulta a um profissional qualificado, tampouco a necessidade de uma avaliação e diagnóstico técnico para a sua aplicação adequada.